

## Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Jęczmień jary</b>			
1	Basic	2011	2013
2	Ella	2012	2014
3	KWS Atrika	2013	2015
4	KWS Olof	2010	2011
5	Penguin	2013	2015
6	Soldo	2013	2014
7	Paustian <sup>R</sup>	2016	2017
<b>Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Antonella 5.0°	2012	2014
2	KWS Meridian 5.0°	2012	2015
3	SU Melania 4.5°	2014	2016
4	Titus 5.0°	2013	2014
5	Zenek 5.5°	2014	2016
<b>Owies zwyczajny jary</b>			
1	Bingo	2009	2010
2	Komfort	2013	2016
3	Nawigator	2015	2017
<b>Owies nagi jary</b>			
1	Nagus	2011	2013
<b>Pszemica zwyczajna jara</b>			
1	Arabella (A)	2011	2013
2	Harenda (B)	2014	2015
3	Goplana (A)	2015	2017
4	KWS Torridon (A)	2012	2013
5	Tybalt (A)	2005	2007
<b>Pszemica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Arkadia (A) 6.0°	2012	2013
2	Artist (B) 4.0°	2014	2016
3	Belissa (B) 5.0°	2015	2017
4	Delawar (A) <sup>R</sup> 4.0°	2016	2017
5	Fakir (B) 4.5°	2014	2015
6	Hondia (A) 5.5°	2015	2017
7	Julius (A) 5.0°	2012	2014
8	KWS Ozon (B) 4.0°	2011	2014
9	Linus (A) 4.0°	2012	2015
10	Praktik (A) 4.0°	2013	2015
11	RGT Kilimanjaro (A) 4.0°	2015	2017
12	Rotax (B) 5.0°	2015	2017
13	Sailor (A) 4.5°	2012	2013

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Pszemczyto jare</b>			
1	Dublet	2006	2007
2	Mazur	2014	2015
3	Sopot	2015	2017
<b>Pszemczyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Meloman 5.5°	2015	2016
2	Panteon <sup>R</sup> 6.0°	2016	2017
3	Pizarro 5.0°	2009	2011
4	Rotondo 5.5°	2015	2017
5	Tomko 6.0°	2013	2014
6	Trapero <sup>R</sup> 6.0°	2016	2017
<b>Żyto ozime</b>			
1	Horyzo	2012	2014
2	Stanko	2011	2012
3	Poznańskie <sup>R</sup>	2016	2017
4	KWS Livado F <sub>1</sub> <sup>R</sup>	2016	2017
5	SU Performer F <sub>1</sub>	2015	2016
6	SU Stakkato F <sub>1</sub>	2013	2014
7	Tur F <sub>1</sub>	2014	2016
<b>Rzepak jary</b>			
1	Lennon	2013	2016
2	Delight F <sub>1</sub>	2010	2015
3	Kaliber F <sub>1</sub>	2009	2016
4	Legolas F <sub>1</sub>	2014	2016
5	Lumen F <sub>1</sub> <sup>R</sup>	2016	2017
<b>Rzepak ozimy</b>			
1	ES Valegro	2015	2016
2	Lohana	2013	2016
3	Sherlock	2011	2014
4	Alexander F <sub>1</sub> <sup>R</sup>	2016	2017
5	Alvaro KWS F <sub>1</sub> <sup>R</sup>	2016	2017
6	Atora F <sub>1</sub> <sup>R</sup>	2016	2017
7	Bonanza F <sub>1</sub>	2013	2017
8	Garou F <sub>1</sub>	2014	2017
9	Kuga F <sub>1</sub> <sup>R</sup>	2016	2017
10	Marcopolos F <sub>1</sub>	2013	2016
11	Mercedes F <sub>1</sub>	2014	2017
12	Popular F <sub>1</sub>	2015	2017
13	Visby F <sub>1</sub>	2009	2010

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe			
1	Akord	2012	2013
2	Batuta	2012	2014
3	Tarchalska	2004	2008
Groch siewny odmiany pastewne			
1	Hubal	2005	2008
2	Turnia	2011	2013
Łubin wąskolistny			
1	Kalif	2006	2010
2	Regent	2009	2015
3	Rumba	2015	2017
4	Tango	2012	2014
5	Wars	2014	2015
Łubin żółty			
1	Baryt	2011	2013
2	Bursztyn	2014	2016
3	Lord	2006	2017

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Ziemniak odmiany jadalne			
bardzo wczesne			
1	Arielle	2014	2016
2	Denar	2001	2008
3	Lord	2001	2008
wczesne			
1	Gwiazda	2012	2014
2	Ignacy	2014	2016
3	Michalina	2010	2012
4	Vineta	2001	2012
średniowczesne			
1	Finezja	2009	2011
2	Satina	2001	2013
3	Tajfun	2004	2008

**Objaśnienia:**

A – odmiany jakościowe, B – odmiany chlebowe

F<sub>1</sub> – mieszańiec

<sup>R</sup> – odmiana wstępnie rekomendowana

\*-zimotrwałość: 9- bardzo duża, 5- średnia, 1- bardzo mała (wg COBORU)

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 26 stycznia 2017 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko – pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO